一昨年創メテ採集セシ Diachea cylindrica Bilgram. トノ二種以外未ダ發見アリシヲ聞カズ、米國ハ五種二變種、又英國ハ三種ノミニシテ世界中ノ合計ハ八種二變種ナリト云フ



自生地ニ於ケルこまくさ (Dicentra pusilla Sieb. et Zucc.) ノ子葉ノ狀

(大正十三年九月信州八ケ岳ニテ岡田喜一撮影)

○一枚シカ無イこまくさノ貝割レ葉

岡田喜一

寡聞ナル小生ガこまくさ (Dicentra pusilla Sieb. et Zucc.) ノ貝割レ葉（甲拆葉（カフタクエフ））即チ子葉 (Cotyledon) ガ單一デ只一枚シカナイ（元來ハ二枚アルベキ筈ノモノダガ）コトヲ知ッタノハ數年前親シク之ヲ播種シテ初メテ經驗シタノデアル其後念ノ爲メ自生地ニ於ケル自然ノ狀態モ知リタク思ッタノデ大正十三年九月ニ武田理學博士ノ驥尾ニ附シテ信州ノ八ケ岳ヘ登山ノ折ニ實地ニ就イテ調ベタ所、幸ニ砂礫ノ間カラ生エテヰタ細長倒披針形ノ該草ノ單子葉ヲ確認スルコトヲ得タ（寫眞參照）



こまくさ (Dicentra pusilla S. et Z.) ノ種子ト甲拆

(略ボ自然大)　(岡田喜一撮影)

此現象ハ從來平凡ナル周知ノ事實トシテ專門ノ方々ニハ既ニ認メラレテ居ラレタカモ知レナイガ門外漢ナル小生ニハ初メテノアリ特別ニ興味ガ惹カレ且敎ヘラルヽコトガ尠クナカッタ、由テ取敢ヘズ本稿ニハタヾ其事實ノ報告ノミヲ錄スルコトヽシタ、小生ノ檢シタ子葉ハ長サ三・二糎、幼根三・五糎、子葉ノ最廣幅部ハ二糎弱デ色ハ淡蒼綠白色デ下部ニ至ルニ從ッテ色ガ淡クナッテキタ自生地デハソレガ直立シテキルヨリモ斜ニヘノ字形ニ彎曲シ其先端稍ヤ上向スル傾向ノモノガ多カッタ

外國デハけし科ニ屬スルモノヽ中ニ單子葉ノモノヽアルコトヲ記シタモノハ散見スルガマダ我邦カラノ文獻ニハ之ヲ報ジタモノヽナイ樣ニ思ハルヽマヽ記シテ委曲御敎示ヲ願フ次第デアル

（追記）本稿ヲ草シテヨリ二ケ月餘ノ後、信濃博物學雜誌第三十九號（大正二年五月五日發行）ニ河野齡藏氏ガ既ニ本種ガ單子葉デアルコトヲ見ラレタトノ記事ノアルノヲ見テ私ハ玆ニ一ノ有力ナル裏書ヲ得タコトヲ喜バシク思フ

【牧野曰フ、松平康民、加藤泰秋、青木信光、久留島通簡ノ諸子爵連中ノ山草會時代ノ或ル年、ソレハ今カラ約ソ十五六年程モ前デハナカッタカト思フ同ジ仲間ノ木下友三郎氏デアッタカ城數馬氏デアッタカこまくさノ種子ヲ鉢ニ播イテ澤山之レヲ生ヤシテ會ヘ持チ出シ當時其一枚シカナイ子葉ヲ見テ珍ラシイコトダト言ヒ噺シテ居ッタ事ガアッタ此レガ抑モ我邦デ此子葉ニ氣ノ付イタ始メデハナイカト思フ、西洋ノ書ニハ疾ニ近緣ノえんごさく屬即チ Corydalis ノ胚ニハ唯一枚ノ子葉ヲ有ッテ居ルト書イテアルガ我ガきけまんヲ始メトシみやまきけまん、やぶげまん、むらさきけまん、じろばうえんごさくナド皆然ルヤ否ヤ實地ニ其種子ヲ播イテ之ヲ實驗セバ必ズ面白イ結果ガ得ラレヤウト思フ】

○斷枝片葉（其二十四）

牧野富太郎

●ねざさヲ見ヌ珍ラシイ土地　南伊勢度會郡穗原村ハ珍ラシクモ村内ニ一本ノねざゝモ生ジテ居ラヌソレ故新ニ土地ヲ開墾スル時ナド此煩ハシイさゝガ無クテ誠ニ都合ガヨイ、同村押淵ニハきくしのぶノ多イ鬼ケ城山